

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	1/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

1. RESULTADOS ESPERADOS

Orientar profissionais de saúde em relação a utilização de Equipamento de Proteção Individual: máscara N 95, mascaró cirúrgica, óculos ou protetor facial, capote de barreira e capote impermeável

2. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS

Áreas assistências

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

O uso de EPI é fundamental para garanti a saúde e segurança do profissional, visando diminuir a exposição do profissional a risco de contaminação por acidente de trabalho.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	MATERIAIS	DESCRIÇÃO DA AÇÃO
- Procedimento que manejam as vias aéreas, como	Profissional médico, enfermeiro e	Máscara N 95, Máscara cirúrgica,	- Higienize as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica

IT.COVID.012-02



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	2/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

intubação, extubação, aspiração, ressuscitação, cardiopulmonar, ventilação não invasiva e broncoscopia.	técnico de enfermagem na assistência	de óculos ou protetor facial, capote Impermeável e capote de barreira,	a 70% (antes e após colocar e retirar os EPI); - Paramentar-se antes de entrar em contato com o paciente; - Utilizar o gorro cobrindo o pavilhão auditivo; - O capote ou avental (gramatura mínima de 30g/m ²) deve ser utilizado para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. - Colocar o avental impermeável. Realizar a amarração pela parte
- Presença de carga viral na saliva, lágrima e secreção ocular do paciente.			



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	3/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

			<p>interna e na parte posterior do corpo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizar o elástico da máscara por cima do gorro no pavilhão auditivo. - Colocar a máscara cuidadosamente cobrindo a boca e o nariz, executar o teste de vedação. Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara ; - Atentar-se para o correto ajuste da máscara à face;
--	--	--	--

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	4/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

			<ul style="list-style-type: none"> - Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente da máscara, que pode estar contaminada, mas remova sempre pelas tiras laterais); - Trocar a máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis - Deve-se inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou equivalente, antes de
--	--	--	--

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	5/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

		<p>cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida.</p> <p>Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas;</p> <p>- NÃO deve usar a máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação;</p> <p>- A máscara N95 deve ser descartada após a presença de</p>
--	--	---

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	6/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

			<p>contaminação por sangue ou fluídos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - O tempo de uso da máscara N95/PFF2 ou equivalente, em relação ao período de filtração contínua do dispositivo, deve considerar as orientações do fabricante; - O número de reutilizações da máscara N95, pelo mesmo profissional, deve considerar as rotinas orientadas pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar
--	--	--	--

IT.COVID.012-02



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	7/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

			(CCIH) que é 12H, quando houver contato com paciente confirmado COVID-19; - A máscara N95 pode ser reprocessada na sterrad por 2 vezes, segundo orientação da SCIH; - Calçar as luvas bem ajustadas por cima do punho do avental; - Após retirar o EPI, não tocar o rosto ou a face antes de higienizar as mãos; - Os óculos de proteção
--	--	--	--

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	8/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

		<p>ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, devendo, imediatamente após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for compatível), hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante ou pela CCIH do serviço;</p> <p>- Na desparamentação retirar a primeira luva de</p>
--	--	---

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	9/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

		<p>forma segura com a mão oposta, tocando na parte externa para puxá-la, invertendo-a para o avesso na retirada. Com a mão desluvada, retirar a outra luva, pegando por dentro na parte não contaminada, invertendo-a também para retirada. Higienizar as mãos com preparação alcóolica a 70% e desamarrar o avental de forma segura sem movimentos bruscos para não levantar gotículas. Retirar ao avesso e</p>
--	--	--

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	10/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

		<p>também manusear pelo avesso para desprezá-lo a cada uso no lixo (saco vermelho);</p> <p>- Após retirar o EPI, não tocar o rosto ou a face antes de higienizar as mãos;</p>
--	--	---

4. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

É importante assegurar que os profissionais que participarão de atendimento tenham o treinamento adequado sobre as técnicas de precaução padrão, por contato e por aerossóis. Recomenda-se que os profissionais selecionados para atendimento a estes pacientes não apresentem características definidas como grupo de risco (diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares pré-existentes ou que fazem uso de medicamentos com inibidores de enzima conversora de angiotensina). Essa instrução

IT.COVID.012-02



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	11/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

de trabalho tem por objetivo garantir a segurança e instrumentalizar os profissionais que atuam na assistência de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos com infecção pelo novo corona vírus suspeito ou confirmado.

5. RISCOS

Assistenciais

Contaminação do profissional por agentes biológicos.

Ocupacionais

Contaminação do profissional por agentes biológicos.

Ambientais

Contaminação do meio ambiente por agentes biológicos.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	12/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de vigilância Sanitária. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 **Orientações para serviços de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Corona Vírus** (Atualizado em 31/03/2020).


SCIH. **Competências em Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos geradores de Aerossóis Passo a passo para colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual.** Disponível em:

https://www.ccih.med.br/wp-content/uploads/2020/03/Procedimentos-geradores-de-aerossóis_-_Passo-a-Passo-para-colocacao-e-retirada-de-EPIsDig.pdf Acessado em: 24/03/2020.


SOBECC. **Protocolos de fluxo de atendimento: Recomendações relacionadas ao fluxo de atendimento para paciente com suspeita ou infecção confirmada pelo COVIN-19 em procedimentos cirúrgicos ou endoscópicos**, de 30 de março de 2020. Disponível em:

http://sobecc.org.br/arquivos/RECOMENDACOES_COVID_-19_SOBECC_MARCO_20201.pdf

IT.COVID.012-02



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.012.02	02	13/13
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira revisão	Setembro 2021	

CONTROLE DE EMISSÃO		
Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:
Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem  <i>Kátia Cordeiro</i> Gerente de Enfermagem COREN-PB 384295	Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade  <i>Bruno da Silva Brito</i> CREFITO 171763-F Gerente Multidisciplinar / Qualidade Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires	Gilberto Costa Teodózio Direção Assistencial  <i>Gilberto C. Teodózio</i> COREN 39210 DIRETOR ASSISTENCIAL Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires Antônio Cavalcanti Pedrosa Direção Geral  <i>Antônio Pedrosa</i> DIRETOR GERAL Mat.: 187.750-0 Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires